

DELVIS FJERNELSE AF MANDLER I FULD BEDØVELSE (TONSILLOTOMI)


(December 2021)

Jeres barn har fået tid til delvis fjernelse af sine mandler i fuld bedøvelse

Mandlernes funktion:

Mandlerne er en del af kroppens immunforsvar og udgør sammen med det øvrige såkaldte lymfoide væv i svælget, en mindre del af immunforsvaret.

Da mandlerne kun udgør en del af det lymfoide væv i svælget, kan man sagtens reducere mandlernes størrelse. De formindskede mandler fastholder deres funktion .



Hvorfor formindske mandler:

Den primære årsag er, at de af en eller anden grund er blevet for store. Store mandler i sig selv er ikke en sygdom og kræver ikke behandling. Nogle børn oplever dog symptomer på for store mandler. Det kan være ophold i vejrtrækning under søvn (søvnåpne), dette kan bla. medføre at barnet bliver

hyperaktivt i dagstimerne. Nogle har problemer med at synke og dermed spise almindelig kost.

Det er, således ikke størrelsen på mandlerne der er grund til at operation, men symptomerne.

Andre gener som tilbagevendende halsbetændelser, tidligere byld i halsen, dårlig ånde og propper i mandlerne tilbydes ikke delvis fjernelse, men total fjernelse. Dette henvises til på hospital.

Fordelen ved delvis fjernelse er færre smerter og mindre risiko for komplikationer som f.eks. blødning.

Før operation - fasteregler:

Barnet skal faste (må ikke spise) i 6 timer op til det aftalte operationstidspunkt. Det er tilladt at drikke klare væsker (sød saft og vand) indtil 2 timer før operation. Barnet må **IKKE** drikke mælk eller juice.

Det er livsvigtigt at barnet er fastende

De sidste 2 timer inden operation må barnet ikke få noget at drikke.

To timer før operationen gives smertestillende stikpille panodil som enkeltordination dosis 40 mg per kilo. Efter operation kan der være behov for panodil efter vanlig dosis/vægt, og der udleveres recept på stikpille Voltaren efter vægt, der kan bruges som supplement.

Af hensyn til hygiejne og infektionsrisiko skal barnet møde nyvasket og med rent hår. Overtøj må ikke medbringes på operationsstuen.

Barnet skal ledsages af to voksne personer, således at den ene kan tage sig af barnet under hjemtransporten. Søkende må ikke medtages på operationsdagen.

Om operationen:

Selve indgrebet på mandlerne foregår gennem munden mens barnet sover. Efter operationen bliver barnet vækket og flyttet til et opvågningsleje, hvor en opvågningsassistent sammen med jer observerer barnet i ca. 20 minutter efter operationen. Såfremt der ikke er blødning kan I komme hjem igen derefter.

Hvis dit barn er i behandling med astmamedicin (inhalator: den orange-brune og den blå), skal I medbringe disse.

Om bedøvelsen:

I klinikken på dagen møder i klinikens faste narkoselæge, som forestår selve bedøvelsen. Under operationen sikrer narkoselægen sig, at barnet sover trygt og godt og er smertedækket under indgrebet.

Efter operationen:

I bør ikke tage offentlig transport hjem, men enten køre i bil eller tage en taxi sammen. I de første to døgn efter

operationen skal der være en voksen sammen med barnet kontant.

Efter operation er der en meget lille risiko for, at der kan opstå pludselig blødning. Dette er sjældent, og skulle kraftig blødning opstå skal dette tages alvorligt. Derfor er observationen de første to døgn vigtig.

I tilfælde af kraftig frisk blødning fra næse eller mund, skal der med det samme ringes 112 og køres med ambulance til nærmeste hospital

Om eftermiddagen kontakter vores sygeplejerske jer og hører hvordan det går.

Forholdsregler efter operation:

Dit barn skal passes hjemme som anført på operationsdagen og i weekenden, men kan som oftest komme i institution om mandagen. I nogle tilfælde må der beregnes flere sygedage.

Kontrol efter operation:

Der aftales ikke rutinemæssig kontrol efter delvis fjernelse af mandlerne, men såfremt operationen ikke har haft den ønskede effekt, vurderet efter ca. 3 måneder, er I velkomne til at kontakte klinikken for en kontrol

Med venlig hilsen

Øre-Næse-Halsklinikken
i Borgergade.