

Medicinvejledning i forbindelse med operation

Dit barn skal have lagt dræn i ører.

Dette indgreb kræver IKKE smertestillende

Dit barn skal have fjernet børnepolypper

1-2 timer før operation gives smertestillende Panodil stikpille eller oral.

Dosis er 40 mg/kg, hvilket er højere end anvist i indlægssedlen.

Efter operation bliver der ofte behov for smertestillende. Der anbefales Panodil efter 4 timer, som I plejer at give det og det efter almindelig dosis/kg.

Der vil forventeligt ikke være behov for smertestillende i mere end 2-3 dage

Dit barn skal have delvis fjernelse af mandler

2 timer før operation gives smertestillende stikpille eller oral.

Dosis er 40 mg/kilo, hvilket er højere end anvist i indlægssedlen.

Efter operation skal der 4 timer senere gives Panodil igen og det efter almindelig dosis/kg, Der skal suppleres med Bonyl mikstur, som I får recept på, og skal hente på apotek. Det er efter vægt, og dosis står anvist på medicinen, når I henter på apotek.

Der vil forventeligt være brug for smertestillende 3-4 dage, ellers kontaktes klinikken.

Øre-næse-hals klinikken

Borgergade 20.5.

1300 Kbh K

Tlf. 33113158